



**INSECTICIDA  
USO DOMESTICO**

**K-Othrina<sup>®</sup>**

**LPU**

**deltametrina**

*Listo para usar*

**ANTES DE USAR LEA LAS  
INSTRUCCIONES DEL ROTULO**



**CUIDADO!  
PELIGROSO!**

**Contenido: 500 cm<sup>3</sup>**



# K-Othrina<sup>®</sup>

LPU

**Listo para usar**

K-Othrina<sup>®</sup> LPU es el insecticida para uso doméstico, especialmente formulado en base acuosa sin solventes. K-Othrina<sup>®</sup> LPU no tiene olor, no mancha. Viene Listo Para Usar, agítelo y aplíquelo. Actúa por contacto controlando insectos rastreros (cucarachas, hormigas, garrapatas y arañas) y voladores (moscas, mosquitos, polillas) donde estos se posan.

**MODO DE EMPLEO:** Gire la punta de la pistola hasta la posición ON y pulverice (sin chorrear) en lugares donde transitan y se posan los insectos (alacenas, zócalos, bajo mesadas). Aplicar cada 20-30 días en caso que se vuelvan a ver insectos.

**COMPOSICIÓN:** Deltametrina 0,0225% p/v; Emulsogen EL360; Fenilsulfonato de Ca; BHT; Palatinal N; Ácido Acético; Amargante.

**PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION Y ABSORCION POR LA PIEL.** No aplicar sobre alimentos ni en superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. No comer, fumar ni beber durante su uso. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.** No transportar ni almacenar con alimentos. No tocar las superficies tratadas hasta que estén secas. Mantener en su envase original y bien cerrado. No reutilizar los envases vacíos ni el aplicador con otros fines. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Por ingestión accidental concurrir al médico llevando este envase. No provocar el vómito. Por salpicaduras en ojos enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos. En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado.

**AVISO AL MÉDICO:** Clase IV. Banda verde. Grupo Químico: piretroides.

Nombre común: deltametrina.


Aplicar tratamiento sintomático y antihistamínico.

R.N.P.U.D. N°: 0250047. BAYER R.N.E. N° 020032212

REOPEN S.A. R.N.E. N°: 020032743 - R.N.E. N°: 020047872

Uruguay: Reg. MSP N°: 64026 - IMM S. de S.P. N° 461

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** Cap. Fed.: Centro Toxicológico de Hospital de Niños, Tel.: (011) 4962-6666 / 2247 / 0800-444-8694. Bs.As.: Centro Nac. De Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo, Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-8648 / 0800-333-0160. Hospital de Niños de La Plata, Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911. Rosario: Centro Toxicológico TAS, Tel.: (0341) 424-2727 / 448-0077 (At. 24 hs). Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel.: (0351) 427-6200 Int. 4135 **Uruguay:** Consultar al C.I.A.T (Hospital de Clínicas, 7°P) Tel.: (2) 1722.



**No inflamable**

Industria Argentina



Lote N°

Vto.:

**Bayer S.A.** R. Gutiérrez 3652 (B1605EHD) Munro - Bs. As

Tel.: 0800-4444-2822 (CUCA) / (011) 4762-7000

[www.proteccionambiental.com.ar](http://www.proteccionambiental.com.ar)

**Uruguay: Bayer S.A.**

Luis A de Herrera 1248 WTC

Torre III Unidad 2074/2075

Montevideo. Tel: 192-2300

59974401d 01/2017